


Avertissement

**Protocole du service de gastroentérologie,
hépatologie et nutrition du CHU Sainte-Justine**


**ATTENTION, ces protocoles sont donnés
à titre indicatif et ne doivent être utilisés
que par des praticiens autorisés.**

**Ils reflètent uniquement la pratique locale
dans le service de gastroentérologie,
hépatologie et nutrition du CHU Sainte-
Justine.**


Cholestases Néonatales



Étiologies des cholestases néonatales




Cholestase néonatale à bilirubine conjuguée




* voir détails des conduites à tenir


DETAILS DES CONDUITES A TENIR :



DETAILS DES CONDUITES A TENIR :



DETAILS DES CONDUITES A TENIR :



Traitements des cholestases à bilirubine conjuguée

- Supplémentation en vitamines liposolubles:
 - vitamine K = 1 mg DIE PO
 - vitamine E = 2 ml DIE PO d'aquasol (50 UI/ml)
 - vitamines A et D = 1-2 ml DIE PO de trivisol (vit A 1500 Ui/ml et vit D 400 ui/ml)
- Nutrition adaptée à 150 kcal/kg/j
- Acide urso (uniquement en l'absence d'obstacle biliaire)
15-20 mg/kg/j en 2 prises PO
Contre indication en cas d'échec de Kasai